

TIM HOLLINGSE D, MD

2965 W. 3500 S.
West Valley City, UT 84119

Asistente del consultorio:
801.965.3566

Recepcionista: 801.965.3425

Posibles complicaciones (entre otras):

- Conversión a una incisión grande
- Lesión del conducto biliar
- Lesión del intestino
- Pérdida de bilis, sangrado o infección de la herida

Información posoperatoria

- Los puntos están debajo de la piel y se disolverán por sí solos
- Se colocarán cintas quirúrgicas Steri-Strips sobre las incisiones
- Deje las cintas quirúrgicas Steri-Strips puestas durante 7 a 10 días
- Puede quitarse las CURITAS en 1-2 días
- Puede ducharse 24 horas después de la operación
- Puede usar medicamentos antiinflamatorios (p. ej., Advil, Motrin, Ibuprofeno, Aleve o Nuprin) además de los medicamentos para el dolor recetados
- Evite tomar Tylenol o acetaminofén si está tomando los medicamentos para el dolor recetados
- Puede sentir como que le han dado un puñetazo en el costado o que tiene una distensión muscular. Su malestar será su guía para su actividad
- Es posible que sienta náuseas durante unos días después de la operación
- Es posible que no sienta hambre durante algunos días después de la operación. Siempre y cuando tolere líquidos, estará bien
- Con el tiempo, podrá comer o beber lo que quiera, incluso sin su vesícula biliar
- Si se siente estreñido, tome un poco de leche de magnesio
- Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a mi consultorio al 801.965.3566 durante el horario de atención o al servicio de contestador al 801.461.5842 después del horario de atención o los fines de semana

Colecistectomía laparoscópica
Extracción de la vesícula biliar utilizando cámaras e instrumentos pequeños

