

Instrucciones del paciente para la colonoscopia

Actualmente su colonoscopia está programada para el _____, en la siguiente ubicación:

Northpointe Surgical Center

2326 N. 400 E.
Bldg. C, Ste. 100
Tooele, UT 84074
435.843.0180

Alta View Hospital

Outpatient Specialty Center
9450 S. 1300 E.
Sandy, UT 84094
801.501.6488

Utah Surgical Center

3715 W. 4100 S.
West Valley City, UT 84120
801.957.0200
Llame al centro
para preguntar la hora.

Riverton Hospital

3741 W. 12600 S.
Riverton, UT 84065
801.285.2775

Este centro se comunicará con usted el día antes para verificar su hora de llegada. Si su colonoscopia está programada para un lunes, se comunicarán con usted el viernes anterior.

RECETA MÉDICA INCLUIDA

RECETA MÉDICA ENVIADA A LA FARMACIA

Llame al 801.965.3698 si necesita cancelar o volver a programar su colonoscopia.

Las cancelaciones deben hacerse con 5 días de anticipación para evitar que se le haga un cobro por no presentarse.

****SIGA POR COMPLETO ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN****

Es imprescindible que siga estas instrucciones para evitar que se vuelva a programar su procedimiento.

El día antes de su procedimiento:

Beba **sólo líquidos transparentes** para el desayuno, almuerzo y cena (TODO EL DÍA). La hidratación es muy importante; entre más líquidos transparentes beba, mejor será su preparación.

Por la **mañana**, mezcle el recipiente de **GOLYTELY/TRILYTE como** se indica en el envase. Vacíe uno de los paquetes de sabor en el recipiente, luego llénelo con 4 litros de agua tibia hasta la línea de llenado superior del envase. Colocar en el refrigerador para enfriar.

Por la **noche**, comience su preparación a **las 6 p. m. Beba la MITAD** del recipiente (2 litros) bebiendo 8 onzas cada 10 minutos. Es mejor beber rápidamente la solución que beber pequeñas cantidades continuamente. Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la hora de acostarse.

Tome 2 tabletas de GAS-X la noche anterior a su procedimiento para ayudar a que la preparación funcione mejor.

La mañana de su procedimiento:

Beba la segunda mitad (2 litros) de Golytely/Trilyte 4 horas antes de su procedimiento (por ejemplo, si su procedimiento es a las 9 a. m., comience a beber la solución a las 5 a. m.). Beba 8 onzas cada 10 minutos hasta que el recipiente esté vacío. **DEJE de beber todos los líquidos 3 horas antes de su procedimiento.**

Líquidos transparentes permitidos: Cualquier líquido que pueda ver a través del líquido. Estos incluyen agua, jugos de frutas transparentes (por ejemplo, manzana, jugo de uva blanca), caldo de cualquier sabor, gelatina de cualquier color, bebidas gaseosas, café negro puro (SIN crema), Gatorade o Powerade. **NO CONSUMIR ALIMENTOS SÓLIDOS O PRODUCTOS LÁCTEOS EN TODO EL DÍA.** Evite líquidos de color ROJO.

¡Recibirá sedación intravenosa (IV) y **DEBE** tener alguien que **FIRME SU SALIDA y LO LLEVE a casa!**

Puede continuar tomando su dosis baja de aspirina. Asegúrese de preguntar acerca de otros medicamentos anticoagulantes, ya que es posible que deba suspenderlos 5 días antes de su procedimiento.

Uno de nuestros Asesores de Beneficios del Paciente se comunicará con usted antes de su colonoscopia para revisar los deducibles y costos de su propio bolsillo